



Московский
многопрофильный
научно-клинический центр
им. С. П. Боткина
Москва

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНОТЕРАПИИ КАК ЕДИНСТВЕННОЙ ОПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ У ВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОК СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ТЕЛА МАТКИ И ТЯЖЕЛОЙ КОМОРБИДНОСТЬЮ



Троцик Е.В.; Сорокина М.В.

Соавторы: Соколов Е.А.; Лебедев С.С.

Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина, Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Рак тела матки занимает лидирующие позиции в заболеваемости среди женщин. У возрастных пациенток, как с впервые выявленным, так и с предлеченым заболеванием, применение радикальных методов и агрессивной химиотерапии часто невозможно из-за тяжелого соматического статуса. В этих условиях гормонотерапия становится единственной доступной опцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведён ретроспективный анализ данных 24 пациенток, имевших противопоказания к хирургическому лечению, лучевой терапии или системной химиотерапии и получавших гормонотерапию в ЦАОП в период с 10.2024 г. по 01.2026 г. Медиана возраста составила 79 лет. Все пациентки имели статус ECOG 2 на момент начала лечения.

ЦЕЛЬ

Оценить клиническую эффективность и переносимость гормонотерапии в качестве единственного возможного метода лечения у возрастных пациенток со злокачественными опухолями матки.



24
пациентки



10.2024 –
01.2026
период лечения



79 лет
медиана
возраста

ECOG

ECOG 2
на момент начала
лечения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГИСТОЛОГИЧЕСКОМУ ТИПУ



13 (54%)
на момент начала терапии было подтверждено висцеральное метастазирование




7 (29%)
выявлены положительные рецепторы эстрогенов и прогестерона



9 (37%)
в анамнезе перенесли радикальное хирургическое лечение +/- лучевую терапию

ЛИНИИ ГОРМОНОТЕРАПИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ НАД ЗАБОЛЕВАНИЕМ



20 (83,3%)
пациенток
контроль достигнут



4 (16,7%)
пациентки
прогрессирование
на фоне терапии

МЕДИАНА НАБЛЮДЕНИЯ



7,5
месяцев

МЕДИАНА БЕЗРЕЦИДИВНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ



не была достигнута

6-МЕСЯЧНАЯ БЕЗРЕЦИДИВНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ

83,3%



ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТЕРАПИИ



удовлетворительная



Гормонотерапия обеспечивает длительный контроль заболевания у возрастных пациенток с тяжелой коморбидностью при злокачественных опухолях тела матки.

ВЫВОДЫ

- ✓ Гормонотерапия представляет собой клинически значимый и приемлемый вариант лечения для возрастных пациенток с высокой коморбидностью или предлеченных, когда радикальные и другие методы противопоказаны.
- ✓ Наибольшую эффективность она демонстрирует при эндометриоидном раке, обеспечивая контроль заболевания более чем у 90% в этой подгруппе.
- ✓ Высокий показатель 6-месячной безрецидивной выживаемости (83,3%) подтверждает способность данного подхода обеспечивать длительный контроль над болезнью.
- ✓ Полученные данные обосновывают целесообразность назначения гормонотерапии в качестве линии лечения для данной категории больных при противопоказаниях к более агрессивным методам.
- ✓ Активность при неэндометриоидных гистологических типах требует дальнейшего изучения.



АВТОР ТЕЙЗИСА:
Троцик Елена Викторовна;
Сорокина Маргарита Викторовна



КОНТАКТЫ АВТОРА:
alena_t@myrambler.ru
+7 (999) 465-780



СОАВТОРЫ ТЕЙЗИСА:
Соколов Е.А.;
Лебедев С.С.



УЧРЕЖДЕНИЕ:
Московский многопрофильный
научно-клинический центр



СТРАНА: Россия
ГОРОД: Москва