

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ (МРРШМ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОВЕДЁННОГО В КЛИНИЧЕСКОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ Н.П. НАПАЛКОВА

АВТОРЫ:

Смирнова Марта Павловна

Хаджимба Анжела Вячеславовна


Максимов Сергей Янович

ГБУЗ «СПЬКНПЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова»

АКТУАЛЬНОСТЬ: качество жизни больных с местнораспространённым РШМ является существенной проблемой.... Оценка этого показателя является важным аспектом анализа эффективности проведённого лечения, позволяя определить влияние различных вариантов лечебной тактики на физическое, психологическое и социальное состояние пациенток

ЦЕЛЬ: сравнить качество жизни больных в зависимости от выбранной лечебной тактики у пациентов.....

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследование включены 267 больных раком шейки матки IIIС ст., получивших комбинированное лечение в Онкоцентре имени Н.П. Напалкова в период с 2014 по 2019 г. Все больные были разделены на три группы. I-я группа – 82 больные, которым в период 2014–2018 гг. была проведена стандартная ХЛТ. II-я группа включала 66 больных, получавших комбинированное лечение в 2015–2019 гг. В III-ю группу были включены 119 больных, проходивших комбинированное лечение, дополненное адъювантной химиотерапией в 2014–2018 гг.



РЕЗУЛЬТАТЫ: проведено сравнение качества пациенток с местно-распространённым РШМ в зависимости от применённой лечебной тактики. Анализ КЖ пациенток показал, что включение АХТ в схему лечения не привело к заметному ухудшению КЖ. По результатам опросника FACT-G, показатели физического, эмоционального и функционального благополучия оставались на приемлемом уровне.

Во всех трёх исследуемых группах КЖ оценивалась с помощью стандартизированного опросника для онкогинекологических пациентов Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT-G). Качество жизни до лечения в исследуемых группах статистически значимо не различаются. Проведенная оценка качества жизни после различных вариантов лечения больных раком шейки матки, начиная с шестого месяца наблюдения продемонстрировала лучшие показатели при выборе комбинированного лечения, по сравнению с группой ХЛТ ($p < 0,05$).

ВЫВОДЫ: Проведённое исследование продемонстрировало статистически значимые преимущества не только в выживаемости, но и в качестве жизни по всем основным параметрам у пациентов, подвергшихся комбинированному лечению по поводу местно-распространенного рака шейки матки. Особенно рельефно различие повышение всех описанных показателей проявляется с 6-го месяца наблюдения после окончания лечения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Клинические рекомендации. Рак шейки матки [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oncology-association.ru/files/clinical-guidelines-2020/rak_shejki_matki.pdf
2. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. – 250 с.
3. Состояние онкологической помощи населению России в 2023 году / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. 236 с.